



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-४१५७१२, जि. रत्नागिरी

नारळावरील महत्वाच्या किडी

१. गेंडवाभुंगा:--आंरिकटी सन्दायनोशीरस

या किडीचा ग्रीड भुंगा माडाच्या शेड्यामध्ये नवीन येणारा कोंब किंवा सुई पोखरून खातो. नवीन वाढणारी सुई कुतडली गेल्यामुळे लागण झालेल्या माडाच्या टाषळ्या त्रिकोणी आकारात कात्रीने जापल्यासारख्या दिसतात. लहान रोपांमध्ये सुई भुंग्याने खाऊन फस्त केल्यास अशा रोपांना नवीन सुई येत नाही. काही वेळेस न उमललेली पोपदेखील भुंगा कुतडून खातो. अशी पोप न उमलता पाळते. त्यामुळे याचा परीणाम माडानी वाढ व उत्पन्न यावर होतो. जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यात या भुंग्याची तीव्रता जास्त आढळते.



ग्रीडभुंगा



प्रादुर्भूतमाड

निर्वाहणाचे उपाय:

- या भुंग्याची पैदास शेणखताच्या खड्ड्यात होत असल्याने बागेजवळ शेणखताचे खड्डे असल्यास अशा खड्ड्यात दर दोन महिन्यांनी १.५ टक्का क्लोरोपायरीफॉस धुकटी मिसळवावी.
- उपद्रव झालेल्या माडांच्या नवीन सुई तूनतारेच्या डुकाने धुगे बाहेर काढून नष्ट करावेत. सुईत सुमारे २५ मि १.५ टक्का क्लोरोपायरीफॉस धुकटी आणि थारीक पावू याचे १:१ या प्रमाणात केलेल मिश्रण घरावे.
- नारळ बागेत ०.६०.६०.६ मीटर आकाराचे प्रति हेक्टरी १० खड्डे ठिकठिकाणी खोदावेत. त्यामध्ये शेणखत घरावे व या शेणखतात १.५ टक्का क्लोरोपायरीफॉस धुकटी मिसळवावी. त्यामुळे या खड्ड्यातील शेणखतात मादी भुंग्यांनी घातलेल्या अंड्यातून बाहेर येणाऱ्या अळ्यांचा नाश होईल.

कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली

stickdv@gmail.com

www.dbskv.org



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-४१५७१२, जि. रत्नागिरी

- बॅक्टेरिया प्रिधानपुस्त धुने ३० ते ३५ प्रति हेक्टर या प्रमाणात बागेत सोडावेत.
- बागेची वेळोवेळी स्वच्छता ठेवावी.
- बागेमध्ये गेंड्याभुंग्याचा गंध सापळा लावावा.

२. सोंड्याभुंगः—दिनकोपोरसफेकशिनीयस

या किडीच्या अळ्या माडाच्या खोडातील मऊगाभा खतात व खोड आतून पोखरतात. तथापि अळ्या खोडाच्या आत असल्याने प्रादुर्भाष झाल्याचे बाहेरून ओळखता येत नाही. खोडाच्या आतील मऊगाभा जास्त पोखरला गेल्यास कालांतराने माड कोलमडतो. प्रादुर्भाष झालेल्या माडाची पाने निस्तेज दिसतात व त्यांची वाढ खुंटते. सोंड्या भुंग्याचा प्रादुर्भाष माडाच्या शेंड्याकडील भागावर झाल्यास वाढणारी सुई किंवा पानाचा कोंब निस्तेज दिसतो. कालांतराने सगळ्या झाकळ्या सुकून माड

प्रादुर्भाष



प्रादुर्भाष, अळी व कोब



प्रादुर्भाषमाड



दगावतो. प्रादुर्भाष झालेल्या ठिकाणी बुंग्यावर छिदे दिसतात व त्यातून ताजा धुस व तांबूस तपकिरी स्त्राव वाहताना दिसून येतो.

निरवणाने उपाय:

- भुंग्याने पाडलेली छिदे बुजवून घ्यावीत.
- राज्य असतील तैपड्या अळ्या कोयतीच्या सहाय्याने काढून टाकाव्यात.
- दाढाला कोणत्याही प्रकारची जखम करू नये. झाल्यास त्याला बोर्दो पेस्ट लावावी.
- झाकळ्या शक्यतो तोडू नये. आवश्यकता असेल तर देढ्यासून २ ते ३ फूट ठेवून तोडावी.
- बागेमध्ये सोंड्या भुंग्याचा गंध सापळा लावावा.



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-४१५७१२, जि. रत्नागिरी

२. चक्राकार पांढरी माशी:—ऑल्प्युरोडिकस सजियोफरक्युलॅटस

सन २०१६ मध्ये रुगीज चक्राकार पांढरी माशीचा प्रादुर्भाव पोलाची (तामिळनाडू) व पलक्कड (केरळ) या राज्यात तसेच सध्या कोंकणातही दिसून येत आहे. या किडीचा उगम मध्य व उत्तर अमेरिकेतील बेलिझ, मेक्सिको, ग्वाटेमाला येथे झाला असून २००९ मध्ये या किडीची प्रथम नोंद शोभिषंत वनस्पतीवर फ्लोरिडा येथे घेण्यात आली.

या किडीची पिल्ले आणि प्रौढ दोघेही पानाच्या खालील बाजूस रस शोषून घेतात. चक्राकार पांढरी माशी शरीरातून गोड चिकट स्त्राव सोडत असल्यामुळे त्याकडे असंख्य मुंग्या आकर्षित होतात व त्यामुळे स्त्राव सर्वत्र पानावर पसरतो. पानाच्या वरच्या बाजूवर गोड चिकट स्त्राव दिसून येतो आणि त्यावर कळत्या बुरशीची वाढ होते. त्यामुळे प्रकाश संश्लेषण क्रियेत अडथळा निर्माण होतो. किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला तर नारळ फळांवरसुद्धा 'चक्राकार आवरणात अडी व प्रौढ दिसून येतात'.



प्रौढमाशी



प्रादुर्भूतमाडीचीपाने

निर्वाहणाचेउपाय:

- या किडीचे नैसर्गिक शत्रू उया. कायसोपा, ढालकिडा, मॅलाडा, इनकार्शिया, लायराष्डी या धुंगा, कातिन, लेट्रओचिनस इत्यादींचे बागेत संश्र्धन करावे.
- ज्या क्षेत्रामध्ये इनकार्शिया परोपजीवी कीटक दिसून येतात अशा क्षेत्रातून ते गोळा करून प्रादुर्भाषित बागेत सोडावे म्हणजे किडीचे जैविक व्यवस्थापन होईल.



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-४१५७१२, जि. रत्नागिरी

- नारळाच्या छावल्यांवर खालच्या वाजून पाड्याचा फवार करवा जेणे करून नैसर्गिक कीटक त्यावर उपजिविका करतील.
- या किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ०.००५ टक्के (३ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून) फवारणी करावी किंवा ०.५ टक्के निमतेल फवारणे.
- पानावरील काढ्या बुरशीच्या व्यवस्थापनासाठी १ टक्का स्टार्च सोल्युशन फवारणे.
- चक्राकार पांढरी मारी आकर्षित करण्यासाठी पिचळे चिकट सापळे माडाच्या रोंड्याकडे लावावे

४. इरिआफाईड कोळी:—अॅसेरियागुरेनिस

नुकसानीचा प्रकार—

ही कीड नारळाच्या देठाखालील आवरणाच्या आत राहून त्या भागातील रस शोषून घेते. परिणामी देठाच्या खालच्या भागात पांढरट, पिचळे त्रिकोणी चट्टे दिसतात. नंतर हे चट्टे वाढत जाऊन त्यांचा आकार त्रिकोणी बनतो.प्रादुर्भूत भागातील फळांची आवरण तडकते. परिणामी नारळ लहान राहतो. काढ्याची व्रत घटते. तसेच लहान फळांची गळ होते.

नियंत्रणाचे उपाय—

- या किडीच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के कडुनिंबयुक्त (अद्याडिरॅक्टीन) कीटकनाशक ७.५ मि.ली. समप्रमाणात पाण्यात मिसळून मुख्यत्वे एप्रिल ते मे, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर व जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीत वर्षानून तीन वेळा द्यावे.
- नारळास ५० किलो कंपोस्ट, १० किलो निशेठी पेंडस टिक, खोर्न, मॉलीब्डेनम व कॉपर ही अतिमूल्य अन्नद्रव्ये २०० ग्रॅम प्रति टाड दरवर्षी द्यावीत.
- १ टक्का कडुनिंबयुक्त कीटकनाशक (१०,००० पी.पी.एम. अद्याडिरॅक्टीन) ४ मि.ली. प्रति लीटर पाण्यातून नारळाच्या घडावर पडेल अशी फवारणी करावी.



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-४१५७१२, जि. रत्नागिरी

५. काढ्या होण्याची अळी:—ऑप्सिनाअरेनोसेल

नुकसानीचा प्रकार—

अळ्या पानाच्या छालच्या भागावर जाळी तयार करून पानातील हरितद्रव्य खातात व त्यामुळे पाने करपल्यासारखी दिसतात.

नियंत्रणाचे उपाय—

- नियंत्रणासाठी १६ मि.ली. डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही किंवा १० मि.ली. डी. डी.पी. ७६ टक्के प्रवाही १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणे.
- किडलेली पाने काढून त्यांचा नाश केव्हास किडीच्या प्रसारास अळा बसणो.
- जैविक नियंत्रणासाठी एका मारण्याच्या दाढावर जर १२ अळ्या आढळून आल्या तर गोनिओदस नेफ्टिडीसहा या अळीचा परोपजीवी कीटक ३,५०० प्रौढ कीटक प्रती हेक्टर या प्रमाणात बागेत दाखल्यावर सोडाव्यात.

६. उंदीर—रेटसरॅटस, बॅंडीकोटाबॅंगालेन्सीस

नुकसानीचा प्रकार—

उंदीर कोवळी फळे पोखरतात व त्यामुळे फळांची गळ होते.

नियंत्रणाचे उपाय—

- माह स्वच्छ ठेवावेत.
- जमिनीपासून २ मीटर उंचीवर ४० से.मी. रुंदीचा गुळगुळीत पत्रा बुंध्याभोवती बसवावा.
- १ भाग लिंक फॉस्फाईड व ५० भाग गव्हाचे पीठ चापासून केलेल्या आमिषाच्या गौळ्या पानांच्या वेचक्यात एक महिन्याच्या अंतराने टाक्याव्यात.
- नवीन लागवड घट्ट न करता योग्य अंतरावर करावी. म्हणजे उंदीर एका माहायकन दुसऱ्या माहावर जाऊ शकणार नाहीत.
- दाढांना स्पर्श करणाऱ्या इतर फांद्या छाटल्यात जेणेकरून उंदरांना दाढावर प्रवेश करता येणार नाही.

कृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, दापोली

stickdv@gmail.com

www.dstickv.org